

## <膵臓がん>

投与量・スケジュールは患者様の状態によって変更となる場合があります。

【GEM療法】28日/1コース

成分名 商品名	投与量	投与経路 投与時間	スケジュール (Day)
ゲムシタビン ゲムシタビン	1000 mg / m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	1,8,15

【nab-PTX+GEM療法】28日/1コース

成分名 商品名	投与量	投与経路 投与時間	スケジュール (Day)
パクリタキセル(アルブミン懸濁型) アブラキサン	125 mg / m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	1,8,15
ゲムシタビン ゲムシタビン	1000 mg / m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	1,8,15

【FOLFIRINOX療法】14日/1コース

成分名 商品名	投与量	投与経路 投与時間	スケジュール (Day)
オキサリプラチン オキサリプラチン	85 mg / m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	1
レボホリナートCa レボホリナート	200 mg / m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	1
イリノテカンドラ イリノテカンドラ	180 mg / m <sup>2</sup>	点滴静注 1時間30分	1
フルオロウラシル 5-FU	400 mg / m <sup>2</sup>	急速静注	1
フルオロウラシル 5-FU	2400 mg / m <sup>2</sup>	持続静注 46時間	1

【LipolRI+5-FU療法】14日/1コース

成分名 商品名	投与量	投与経路 投与時間	スケジュール (Day)
イリノテカン塩酸塩水和物 オニバイド	70 mg / m <sup>2</sup>	点滴静注 1時間30分	1
レボホリナートCa レボホリナート	200 mg / m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	1
5-FU 5-FU	2400 mg / m <sup>2</sup>	持続静注 46時間	1

【GEM+S-1療法】21日/1コース

成分名 商品名	投与量	投与経路 投与時間	スケジュール (Day)
テガフル・ギメラシル・オテラシル エスワンタイホウ	1.25m <sup>2</sup> 未満 60mg/日(40-20) 1.25m <sup>2</sup> 以上1.5m <sup>2</sup> 未満 80mg/日 1.5m <sup>2</sup> 以上 100mg/日	内服 1日2回 朝・夕食後	Day1夕～15朝
ゲムシタビン ゲムシタビン	1000 mg / m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	1,8

最終更新日2023年5月1日