

抗がん剤治療を受けられる方へ

＜早めの受診が必要な症状＞

次に示すようなことがありましたら、すぐに病院にご連絡ください。

1. 感染症状について

- 1) 抗生剤（クラビット錠など）を3日間内服しても熱が下がらない場合
- 2) 抗生剤（クラビット錠など）と解熱剤（カロナール錠など）を内服しているが、
38℃以上の発熱があり、水分も摂れずにぐったりしている場合
- 3) 咳や痰がしつこくて、止まらない場合
- 4) 排尿時の痛み、残尿感、頻尿がある場合

2. 脱水症状について

- 1) 嘔気・嘔吐・口内炎・食欲不振で水分も摂取できない場合
- 2) 尿が普段と比べて、極端に少ない場合
- 3) 治療前に比べて、下痢が1日に4回以上出る場合

3. そのほかの症状について

- 1) 息切れ・呼吸が苦しい場合
- 2) 真っ赤な血尿が出る場合
- 3) 鼻血や歯肉から出血が止まらない場合
- 4) 普段と違い、黒い便が出る場合
- 5) 倦怠感が強く動けない場合
- 6) 普段の会話ができない、意識がもうろうとするなどの症状がある場合
- 7) 腹痛や嘔気を伴う便秘がある場合
- 8) 発疹が急に出てきた場合

上記症状に当てはまる場合は当院に連絡していただき、
必ず当院で化学療法を受けているとスタッフにお伝えください。

牧田総合病院 代) 03-6428-7500

外来 平日9:00~17:00

救急外来 夜間・休日

2023/7 がん化学療法委員会